

## Intro

Protection	oui
Parent	♀ Arcina@Fercer x ♂ Sweetheart@Sumtare
Obtenteur	Ctifl
Editeur	CEP Innovation

## Epoque de maturité : Burlat + 28 à 35 jours (époque Regina, Sweetheart@Sumtare\*)

Zone Précoce	11 juin - 29 juin
Zone Mediane	16 juin – 1er juillet
Zone Tardive	2 juillet – 10 juillet

## L'arbre



Vigueur	Moyenne
Port	Étalé
Ramification	o Densité : forte o Angle d'insertion : ouvert (80-90°)
Formations possibles	o Axe, biaxe, gobelet, mur fruitier
Taille conseillée	o Taille longue avec extinction limite bois d'un et deux ans, taille mixte, taille courte
Productivité	o Mise à fruit : très rapide o Productivité : bonne à très bonne o Régularité de production : bonne o Répartition des fruits sur les branches : bonne répartition le long des rameaux, manchons possibles avec les porte-greffe très productifs
Sensibilités particulières	o Bactériose à Pseudomonas : o Cylindrosporiose : moyenne o Gnomonia : o Stress climatique : non
Besoins en froid	o Hiver doux : sensibilité faible à moyenne

**Le fruit**



Forme	Réniforme arrondie
Pédoncule	Long à très long
Couleur de récolte optimale	Code couleur 4 et 5
Calibre dominant	o Gros à très gros (26-32 mm) o Homogénéité : bonne
Fermeté	Bonne à très bonne (Durofel 25 : 70-85)
Type de saveur	Douce à équilibrée
Sensibilités particulières au verger	o Éclatement : - Niveau : moyen à fort - Lieu : cuvette pédonculaire, joue o Fruits doubles : non o Monilia : faible o Marques : non o Perte pédoncule : très faible (0 à 5%)
Facilité de récolte	Très facile
Aptitude à la récolte sans pédoncule	Très bonne
Maintien qualité après récolte	o Peau granuleuse : non o Marques : très peu sensible o Flétrissement de la chair : non o Pédoncule (dessèchement rapide) : assez sensible

**La floraison et la pollinisation**

Floribondité	Forte
Epoque de floraison / Burlat	Précoce, 1 à 2 jours avant Burlat
Fertilité	o Autostérile
Profil Allèle	S3 S6 <b>o Incompatible avec Ferdiva, Fertille, Kordia, Techlovan, Feroni</b>
Pollinisateurs	o Maturité proche : Sweetheart® avec recouvrement partiel de la floraison o Maturité à plus de 3 semaines d'intervalle : Folfer, Ferdouce, Earlise®, Primulat®, Early Red, Early Star, o Maturité à moins de 3 semaines d'intervalle * : Babelle, Samba®, Lapins * attention aux délais avant récolte suite aux traitements phytosanitaires

**Repères phénologiques**

Nombre de jours	Entre pleine floraison et véraison : 46 jours ± 4 Entre véraison et récolte : 31 jours ± 4 Entre pleine floraison et récolte : 77 jours ± 5
-----------------	---



### Appréciations générales

Variété en début d'évaluation dans le réseau variétés

Variété tardive ayant le plus gros potentiel de calibre.

Très bon maintien qualité de la cerise après récolte excepté le pédoncule qui peut se déshydrater. Surveiller les conditions de stockage et notamment l'hygrométrie de l'air (pas d'excès de ventilation).

Segment de la cerise sans pédoncule : très bonne aptitude à la récolte sans pédoncule

Positif	Arbre facile à former, productivité bonne et régulière, fruit de bonne qualité : calibre, fermeté, saveur, très bonne tenue sur l'arbre et après récolte, fruit facile à récolter
Négatif	Fruit sensible à l'éclatement dans la cuvette pédonculaire, pédoncule sujet à la déshydratation après récolte