

Házikertbe javasolt magyar cseresznyefajták

SZÜGYI SÁNDOR

Magyarországon a cseresznye fajtaválaszték május végétől június végéig terjedő érési időszakot fed le. A cseresznye a szélsőséges talaj- és termőhelyi viszonyok kivételével mindenhol jól termeszthető. Alapvetően önmeddő növény, tehát pollenadó fajtával szükséges telepíteni, de van néhány hazai nemesítésű öntermékeny fajta is. A NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet érdi telephelyén napjainkban is folyik a cseresznye-fajtanemesítő munka, a legfontosabb nemesítési célunk továbbra is a korai érési idő, a legalább 26 milliméteres gyümölcstápméret, a tetszetős gyümölcsmegjelenés, a sötét termésszín, a legalább közepes kocsány méret, valamint a csillogó terméshéj. Azokat az államilag minősített fajtáinkat mutatjuk be, amelyek iránt külföldön is nagy az érdeklődés.

Rita

Virágai középkorán nyílnak, eddigi eredmények szerint a *Valerij Cskalov*, *Petrus*, *Tünde*, *Paulus*, *Bigarreau Burlat*, *Szomolyai fekete* és a *Vera* fajták termékenyítik meg a legjobban. Igen bőtermő, ezért gyümölcse aprósodásra hajlamos, amit rendszeres metszéssel ellensúlyozhatunk. Május 20. körül érik. Gyümölcse közepesen nagy, 6-7 gramm tömegű, átmérője 23-24 milliméter. Széles kúp alakú, a hasi oldalon kissé kidudorodó, repedésre hajlamos. Színe a fogyasztási érettség kezdetén piros, majd bordó. Húsa piros, tömött, közepesen kemény-kemény. Héja fényes, vékony, íze kellemesen édes-savanykás. Fája gyenge-középerős növekedésű, koronája lehajló gömb alakú. Vesszői vörösek, kissé ívesen hajlók. Érési ideje megelőzi a hazai és a külföldi fajtákat.



Sándor

Virágai korán nyílnak. Öntermékeny, rendszeresen és bőven terem, azonban túlkötődésre hajlamos, ezért rendszeres metszést igényel. Május végén-június első napjaiban érik. Gyümölcse



közepesen nagy, 6-7 gramm tömegű, 24-25 milliméter átmérőjű. Alakja kissé megnyúlt gömb, héja sötétbordó. Sötétpiros húsa közepesen kemény, íze édes-savanykás. Kocsánya középhosszú. Fája ritka ágrendszerű, feltörekvő, laza kúp alakú koronát nevel. Középerős növekedésű.

Carmen

Önmeddő. Virágai későn nyílnak, kölcsönösen jól termékenyül a *Germersdorfi 3* fajtával, jó pollenadója a *Sunburst*, *Katalin* és *Krupnoplodnaja* fajta. Bőtermő. Korán termőre fordul, június 5. körül érik. Gyümölcse igen nagy, 8-11 gramm tömegű, 27-30 milliméter átmérőjű,



nyomott gömb alakú. Héja fénylő bordópiros. Húsa sötétpiros, kemény állományú, kellemesen édes-savas ízű. Magja aránylag nagy. Kocsánya közepesen hosszabb, vékony. Fája feltörekvő, gyenge vagy középerős növekedésű, kis koronát nevel. Blumeriellás levélfoltosodással szemben rendszeres védelmet igényel.

Vera

Közepesen korán virágzik, önmeddő. Pollenadói a *Valerij Cskalov*, a *Petrus*, a *Sándor* és



az *Annus*. A *Bigarreau Burlattal* kölcsönösen jól termékenyül. Rendszeresen és igen bőven terem, korán termőre fordul. Június 10. körül érik. Gyümölcsei nagyok, 24-27 milliméter átmérőjűek, 7-9 gramm tömegűek. Alakja kissé nyomott gömb, a bibepontjánál kissé bemélyedt. Színe bordópiros, fénylő. Húsa kemény, de nem roppanó, kellemesen édes-savanykás ízű. Kocsánya középhosszú, magja közepesen nagy. Repedésre kevésbé hajlamos. Fája középerős növekedésű, gömb koronát nevel, vázkarrendszere merev, szétálló. Kompót készítésére is kiválóan alkalmas. A levélbetegségek ellen gondos védelmet igényel.

Krupnoplodnaja

Középidőben nyíló virágait a *Vera*, *Linda*, *Van*, *Katalin*, *Kordia*, *Paulus*, *Carmen*, *Sunburst*, *Regina*, *Stella* fajták termékenyítik. Bőtermő, június 25. körül érik. Gyümölcse 25-28 milliméter átmérőjű, tömege 8 gramm körüli. Alakja a kocsány felől kissé lapított gömb. Héjszíne teljesen éretten sötét kárpiniros. Bár már világospirosan is fogyasztható, érdemes megvárni a teljes érését, mert íze ekkor kellemesen savanykás, édes, zamatos. Húsa kemény, ezért repedésre kissé érzékeny. Magja kicsi. Kocsánya közepesen hosszabb, vékony és hajlékony. Fája középerős növesű, jól alakítható. Kiseb ritka ágrendszerű gömbkoronát nevel.

